notes prises à Corbeil le jeudi 13 mai 1790

L'hydrocéphale de Cri. d'anvers

L'âge de l'enfant	mort à 14 mois, en nourrice, pte fille d'un fr. de 27 ans
depuis quand la maladie.	entre quatre ~~ou~~ et cinq mois, sans cause apparente
mesure de la tête	vue à dix mois, apeuprès 22 pouces de circonferen au bout d'un mois 23 pouces. à un an la tête a cessé de grossir, ayant 24 pouces pendant 6 semaines. dans les 15 derniers jours elle a diminué de environ un pouce.
derniers progrès	+ amaigrissement du corps, oedematie les mains et des pieds.
quand a commencé à le voir	La face vermeille, couleur eteinte vers les 2 derniers mois de la vie Le front très saillant sur tout du coté droit. Les sopra orbitaires. les yeux refoulés sur la paupière infer que couvrit de globe dans ses deux tiers infer.
+ quels signes, outre le volume de la tête.	
quelle partie plus tuméfiée	
desordre dans les sens	
La vue	abolie, la [illegible] continuel
L'ouïe	n'a pas été observé

Le gout —	non dépravé, mangeait avec appetit bouillies, panades — excepté dans les derniers 15 jours,
L'odorat —	— n'a pas fermé
Le mouvement —	foible
Bras	} restait dans la même position
jambes	
facultés internes	
sommeil —	~~continuel~~ inquiet
assoupissement —	oui
cris d'impatience	
de douleurs	lents, plaintifs. cerveau en bon état; quelques hydatides aux plexus choroïdes, ventricules distendus comme de vessies.
déjections	habituellement constipée —
selles	
urines.	altération buvoit beaucoup et les urines couloient

ARC 43-0167

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

n° 323.